

BANKER C-BG/ BANKER E-BG

Macetas plantadas con cereal, cebada principalmente, que contienen pulgones específicos de cereales.

BANKER C-BG está recomendado en cualquier cultivo que se vea afectado por pulgones de las especies *Aphis gossypii* (pulgón del melón o del algodón) y *Myzus persicae* (pulgón verde del melocotonero).

BANKER E-BG está recomendado en cualquier cultivo que se vea afectado por pulgones de las especies *Aulacorthum solani* (pulgón de la digital) y *Macrosiphum euphorbiae* (pulgón de la patata).

Formato: maceta cuadrada con plantas de cereal que contienen un mínimo de 500 pulgones del cereal.

Dosis de aplicación: se recomienda es de 4-6 macetas/hectárea en un principio y semanalmente se irán revisando por si hace falta colocar alguna maceta más para mantener una colonia adecuada.

Cultivos: para todos aquellos cultivos en los que se vaya a soltar *A. colemani* o *A. ervi*.

Modo de acción.

El fundamento del uso de la plantas banker está basado en poder realizar una acción preventiva contra los pulgones que atacan a los cultivos hortícolas.

Antes que los ataques por pulgón sean grandes, lo ideal es introducir plantas banker en los cultivos, repartidas de dos en dos de forma homogénea en el invernadero y con condiciones de humedad adecuadas, para que se vaya reproduciendo sobre el cereal (no afecta al cultivo). Una semana después de haber introducido las plantas, se soltará sobre ellas el parásito que necesitamos instalar, para que éste vaya aumentando su colonia y

en caso de entrar pulgones que ataquen a los cultivos, el *Aphidius* esté en condiciones de detectar dicha entrada e ir a parasitarlos.

Para que la instalación sea buena, se recomienda realizar sueltas de *Aphidius* semanales a una dosis de 0,2 individuos/m². A las dos semanas de haber realizado la primera suelta del parásito, podemos detectar los primeros pulgones del cereal parasitados.

Modo de aplicación/ transporte.

Controlar la exposición a la luz solar.

Transporte y almacenamiento a temperatura ambiente.

Colocar la plantas en zonas del invernadero donde hay humedad para favorecer la instalación.

Usar antes de 20 horas desde la recepción del producto.