

CHRYSOPELTA-BG

Chrysoperla carnea es un neuróptero de la familia *Chrysopidae* y es un buen depredador pulgones (*Aphis* spp. y *Myzus* spp.). Además de alimentarse de áfidos, puede alimentarse de otras plagas.

CHRYSOPELTA-BG está recomendado en cualquier cultivo que se vea afectado por ataques de pulgones aunque también colabora en el control de mosca blanca, trips y araña roja.

Formato: sobre de cartón que contiene 1.000 larvas.

Dosis de aplicación: se recomiendan de 10-20 larvas/m².

Ciclo de vida.

Las hembras suelen poner unos 20 huevos por día, los cuales son depositados en el extremo final de un fino pelo que se encuentra en el envés de las hojas. Pasados 3 días eclosionan los huevos y pasarán por 3 estados larvarios a lo largo de dos semanas; siendo el tercero el más importante ya que es cuando más capacidad de depredación poseen, llegando a devorar alrededor de 50 pulgones por día.

Después de los estados larvarios, puparán y pasadas otras dos semanas, emergerán de dichas pupas los adultos.

Identificación.

Los huevos son alargados de color amarillo-verdoso, pero cambian la tonalidad hacia más oscura con el paso del tiempo. Las larvas presentan el cuerpo deprimido, con pelos en el dorso, pudiéndose diferenciar también diferentes bandas longitudinales con distinta tonalidad de marrón y una serie de puntos también de diferentes colores. Las larvas llegan a alcanzar al final del ciclo sobre 7-8 mm. Las pupas son de tonalidad más clara y textura suave. Por último, los adultos son largos y estrechos de color verde claro, siendo membranosas las alas y casi translúcidas, con las antenas muy largas.

Modo de aplicación/ transporte.

Mantener alejado de la luz solar.

Transporte y almacenamiento en total oscuridad a 12-15°C.

Realizar la suelta siempre a primera de la mañana o última de la tarde.

Usar antes de 20 horas desde la recepción del producto.
