
NEMATODOS-BG



Utilidad:

- Indicado para el control de mosca esciárida (*Bradysia* spp.), trips (*Frankliniella occidentalis*) y para el control de minadores de hojas (*Lyriomiza* spp.).

Contenido:

- Estadíos juveniles infectivos de *Steinernema feltiae* (90%).
- Sustrato inerte con agua (10%).

Dosis:

- Tratamiento preventivo: 10000/m².
- Tratamiento curativo: 350000/m².

Recomendaciones para su uso:

- Eliminar de los conductos por los que tenga que pasar, los filtros cuyos orificios sean menores o igual a 50 mesh.
- Llenar el tanque con agua fría y limpia y mantener activado el sistema de agitación hasta que la aplicación haya terminado.
- Llenar un recipiente con unos 10 litros de agua, añadir la pasta del nematodo y agitar hasta que todo esté disperso y la disolución homogénea.
- Añadir esta suspensión que contiene al nematodo al tanque.
- Terminar de llenar el tanque hasta conseguir la cantidad de agua necesaria para la aplicación. (un 30 % más de la que se suele usar normalmente para realizar un tratamiento químico)
- Aplicar sobre el cultivo, empapándolo bien.

Formas de aplicación:

1. En suelo:
 - Tratar toda la zona del suelo en contacto con la zona radicular tan pronto como se detecten las plagas. En semilleros, tratar directamente el sustrato de las bandejas.
 - El suelo/compost, debe estar húmedo y a una temperatura de 10-30 °C, para que sea eficaz.
2. Contacto foliar:
 - Los nematodos necesitan estar en contacto con agua para poder buscar a su presa.
 - Asegurarse que el tratamiento cubra toda la superficie foliar y que la boquilla de salida no permita que los nematodos se pierdan por escorrentía del agua sobre las hojas.
 - No aplicar en momentos en los que la luz solar incida directamente sobre el cultivo (realizarlos al atardecer). Si se hace en horas donde no hay luz solar pero se usa luz artificial, ésta debe apagarse durante mínimo 2 horas tras la aplicación.

Precauciones:

- No usar el producto con fecha de caducidad cumplida o que haya estado mal almacenado.
- Para información relativa a la compatibilidad con productos químicos, consulte con su técnico.
- Una vez abierto el envase, no lo divida en porciones y si lo tiene en el tanque diluido, no lo reserve para dar tratamientos días posteriores.
- Para realizar el tratamiento, no usar presiones superiores a 16 bares.
- La apertura de la boquilla debe ser mayor a 500 micrómetros.

Almacenamiento:

- A partir de la recepción, utilizar inmediatamente o almacenar en la nevera a 5 °C. No congelar.
-