

NESIDIOCORIS TENUIS



Nesidiocoris tenuis es un chinche depredador muy voraz que controla mosca blanca, *Bemisia tabaci* y *Trialeurodes vaporariorum*. Por su régimen polífago se alimenta también de otros invertebrados tales como huevos de lepidópteros, pulgones y ácaros.

Nesidiocoris tenuis está recomendado para cultivos de tomate, berenjena y judía preferentemente durante el ciclo de primavera-verano o cultivos con calefacción.

Ciclo de vida.

Los estados de desarrollo de *Nesidiocoris tenuis* a lo largo de su ciclo de vida son: huevo, 5 estados ninfales y adulto. Todos los estados de *N. tenuis* a excepción del estado de huevo son depredadores muy voraces de las dos especies de mosca blanca (*Bemisia* spp y *Trialeurodes* spp). Los huevos que son depositados en el interior del tejido vegetal de las plantas. A una temperatura constante de 25 °C y un 75 % de humedad la duración del ciclo de vida de *N. tenuis* es de 21,5 días. Con temperaturas superiores a 25 °C el ciclo de vida será más corto y con temperaturas inferiores, será más largo.

Identificación.

Los adultos miden de 3,5-4 mm de longitud, son delgados, su color es verde claro y presentan alas de color gris claro con manchas negras. Las patas y antenas son de una longitud considerable, y la cabeza es redondeada. Los adultos son los únicos que tienen capacidad de vuelo.